

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



# Cancer du testicule :

## I. Généralités :

- **Cancer rare** : 1 à 1,5 % des cancers chez l'homme **tout âge confondu**.
- La tumeur maligne la plus fréquente chez l'**homme JEUNE (15 à 35 ans)**.
- Principale caractéristique : **souvent curable**.
- **Tumeurs germinales** ++++ (90%).

## II. Facteurs de risque :

- Antécédent de cancer testiculaire ou de néoplasie germinale intra-tubulaire controlatérale.
- Cryptorchidie ou ectopie testiculaire
- Antécédent de cancer du testicule
- Dysgénésie gonadique (syndrome de Klinefelter)
- Atrophie testiculaire post-traumatique
- Orchite ourlienne
- Micro- calcifications
- Infertilité.
- Antécédent familial de premier degré.
- La prise d'œstrogènes par la mère pendant la grossesse,
- L'exposition à certaines substances de l'industrie chimique, ou à certaines substances présentes dans l'environnement (insecticides, herbicides).

## III. Anatomopathologie :

### A. Tumeurs germinales ++++ :

#### ❖ Les cancers à une seule composante histologique :

#### 1) Séminome :

- Tumeur maligne invasive **la plus fréquente**.
- Développé à partir des **cellules germinales primitives des tubes séminifères**.
- Prédomine à **droite**.
- Survient préférentiellement vers **35-40 ans**.
- Dissémination par **voie lymphatique** presque exclusive.
- Bilatéral (2 % des cas) et sur **testicule cryptorchide** (8,5 % des cas).
- Dans 70 % des cas, **stade I au moment du diagnostic**.
- Métastases : **ganglionnaires**, rétropéritonéales, sus-diaphragmatiques.
- **Marqueurs sériques (AFP,  $\beta$ HCG) négatifs** ( $\beta$ HCG peuvent être augmentés de façon modérée dans 10 % des cas).

#### 2) Séminome spermatocytaire : « RARE »

- Issu des **cellules de la spermatogenèse (spermatogonies, spermatocytes...)** et non des cellules germinales primitives.
- Bilatéral dans 10 % des cas et **n'apparaît jamais sur testicule ectopique**.
- Il est **toujours intra- testiculaire**, bien limité et **ne métastase pas**.
- Les marqueurs sont **toujours négatifs**.

#### 3) Carcinome embryonnaire :

- Tumeur germinale formée de **cellules à allure épithéliale**.

- Sécrétion de **marqueurs négative**.
- **Fréquent en association** (35-45 %) et rare dans sa forme pure (moins de 3 %).
- Tumeur de **haute malignité** (grand pouvoir métastatique).
- Dans 70 % des cas, **le stade clinique est élevé au moment du diagnostic** (extra-testiculaire).
- **Diffusion par voies sanguine et lymphatique précoce**.

#### 4) Tumeur vitelline (tumeur du sac vitellin) :

- **AFP = marqueur spécifique** de ce type tumoral.
- **Forme pure rare** (2,5 %), essentiellement **l'enfant de 0 à 5 ans** → Tumeur **volumineuse** ferme et **kystique** dans 70 % des cas.
- Formes mixtes, apanage de **l'adulte**, réalisent des **plages molles et mucoïdes**.
- **Globules hyalins** en microscopie optique sont **pathognomoniques**.
- Elle est **d'évolution rapide**.

#### 5) Polyembryome :

- Tumeur formée de **corps embryoïdes**,
- Rarissime et **hautement maligne**,
- **Jamais retrouvée à l'état pur**.

#### 6) Choriocarcinome :

- Tumeur germinale constituée de **cellules cytotrophoblastiques** et syncytiotrophoblastiques (**βHCG et de la cytokératine**).
- **Hautement maligne**
- Plus **fréquente en association** (15-20 %).
- Parfois symptomatique (accident hémorragique).
- Dissémination **hématogène et lymphatique**, et la βHCG sérique est constamment élevée.

#### 7) Tératome :

- Formes **mixtes fréquentes** (30 %).
- Chez **l'enfant**, ils sont **purs, matures et bénins**.
- Chez **l'adulte** ils sont **mixtes** (essentiellement associés **au séminome ou au carcinome embryonnaire**), immatures et toujours malins.
- Tumeurs volumineuses, hétérogènes, solides et kystiques.
- **Pas de marqueurs spécifiques** des tératomes.

#### ❖ Tumeurs germinales mixtes :

- Association **≥ 2 types histologiques** à l'exception du **séminome spermatocytaire**.
- Association la plus fréquente : **Tératocarcinome (carcinome embryonnaire - tératome)**.
- Marqueurs fréquemment très élevés.
- Pc dépend du **type le plus péjoratif**.
- Dans deux tiers des cas, la tumeur est **extra testiculaire, volumineuse**, associant des **zones kystiques (tératomateuses)** et des **zones charnues nécrotiques (carcinome embryonnaire)**.

#### B. Tumeurs non germinales (10%) :

- Lymphomes malins primitifs ou secondaires.

- Carcinoïde testiculaire.
- Mésothéliome malin.
- Gonadoblastome.
- Métastases (d'origine pulmonaire, prostatique, rénale, vésicale, digestive).
- Tumeurs à cellules de Sertoli : gynécomastie (30 %) et anomalies de la spermatogenèse.
- Tumeurs à cellules de Leydig : (rares 3 %) pseudo puberté précoce chez l'enfant, gynécomastie chez l'adulte (75 %), féminisation, azoospermie(rare), œstradiol augmenté, testostérone basse. Le plus souvent, la tumeur est bénigne.

#### IV. Diagnostic positif :

##### A. Circonstances de découverte :

- Palpation d'une masse testiculaire d'installation progressive (quelques semaines à plusieurs mois) +++
- Masse abdominale, ganglions sus-claviculaires, altération de l'état général, douleurs abdominales ou lombaires, douleurs osseuses, signes neurologiques, compression urétérale, OMI, gynécomastie d'apparition récente.
- Baisse de la libido, bilan d'une stérilité.
- Douleur scrotale aiguë : hémorragie aiguë intra testiculaire, infarctus testiculaire.
- Découverte lors d'un examen systématique.

##### B. Diagnostic clinique :

###### 1) Examen clinique :

- On palpe : déférent, épидидyme, sillon inter épидидymotesticulaire, testicule, ressaut de la vaginale en commençant par le testicule sain.

- Toute **lésion testiculaire** est considérée **comme maligne** jusqu'à preuve chirurgicale du contraire.
- Les lésions de **l'épидидyme** sont **presque toujours bénignes**.

- La palpation abdominale recherche une atteinte rétropéritonéale sous la forme d'une masse épigastrique.
- Palpation des seins à la recherche d'une gynécomastie.
- Examen clinique général (métastases ganglionnaires, viscérales).
- On termine l'examen clinique par la palpation des creux sus-claviculaires et du foie et par un toucher rectal.

###### 2) Formes cliniques :

###### ❖ FORME TYPIQUE :

- Tumeur **dure, irrégulière**, déformant le testicule, **Insensible ou peu douloureuse** à la palpation.
- La tumeur est séparée de l'épидидyme par le sillon inter épидидymotesticulaire (**signe de Chevassu**).
- La tumeur est **opaque à la transillumination**.
- Tumeur pesante, volumineuse, ou nodule testiculaire dur qui peut évoquer à tort un noyau épидидymaire.

- Le reste de l'appareil génital est normal.
- À ce stade, il n'y a pas de diagnostic différentiel, **l'exploration par voie inguinale est la règle.**

❖ **BOURSE AIGUE :**

- Association de **douleurs et de signes inflammatoires.**
- Il peut s'agir d'une **torsion du cordon spermatique**, d'une **épididymite** ou d'une **tumeur testiculaire.**
- **L'exploration** testiculaire par voie inguinale doit être proposée en cas de **doute diagnostique.**

❖ **AUTRES FORMES CLINIQUES :**

- **Bourse vide**, **altération de l'état général**, **douleurs abdominales** et **gynécomastie** → évoquer un cancer **sur testicule ectopique**
- **Douleurs lombaires** + **anorexie** → adénopathies rétropéritonéales.
- **Hydrocèle** ou **hématocèle** d'apparition récente.
- **Métastases viscérales** (rarement).
- Les formes **bilatérales** sont plus souvent **asynchrones** que synchrones.

**Chez l'enfant :**

- La majorité des tumeurs (80 %) sont des **tératomes (Tm bénigne, énucléation chirurgicale, surveillance clinique).**
- Dans près de 20 % des cas, il s'agit de **tumeurs du sac vitellin** (Tm malignes,

**C. Examens complémentaires :**

❖ **A VISEE DIAGNOSTIQUE :**

**1) Echographie scrotale « EXAMEN DE REFERENCE » :**

- Fait la différence entre tumeur intra testiculaire et tumeur extra testiculaire et vérifie l'aspect du testicule controlatéral.
- Nodule hypoéchogène ou hétérogène non spécifique d'un type tumoral en général hyper vascularisé.
- En cas de doute, l'exploration testiculaire par voie inguinale est indiquée.

**2) Marqueurs sériques :**

**a) L'AFP (alpha foeto-protéine) :**

- Signe une **TGNS.**
- **Taux normal : <15 ng/ml.**
- Elevée dans les **hépatites virales** ou **l'hépatocarcinome.**

**b) L'hormone chorionique gonadotrope (HCG totale) et sa sous-unité bêta :**

- TGNS contenant du choriocarcinome (syncytiotrophoblaste), gynécomastie.

**c) La lactico-déshydrogénase (LDH) :**

- Marqueur non spécifique, élevée dans les **masses tumorales importantes.**

**d) AFP, HCG, LDH :** intérêt pronostique et surveillance.

**e) La phosphatase alcaline placentaire (PLAP)** n'est plus utilisée en pratique courante du fait d'un manque de sensibilité et de spécificité.

### 3) Orchidectomie élargie :

- Élargie au cordon avec clampage premier de celui-ci au niveau de l'orifice profond du canal inguinal, par voie inguinale exclusive.
- **Tout abord d'un testicule tumoral par voie scrotale est proscrit.**
- **La biopsie trans-scrotale est proscrite.**

### ❖ BILAN D'EXTENSION :

#### ➤ Clinique :

- Examen lymphoganglionnaire,
- Examen pleuropulmonaire,
- Recherche d'une gynécomastie,
- Examen somatique général.

#### ➤ Radiologique :

- **Radiographie pulmonaire** préopératoire de référence,
- **TAP** : examen de référence (métastases et ganglions).
- **IRM pelvienne** : contre-indication à la TDM ou pour préciser les rapports avec les gros vaisseaux.
- **Echographie hépatique** : localisations secondaires de petite taille (nodules hypodenses non spécifiques).
- **Imagerie cérébrale** : patients symptomatiques ou présentant une localisation secondaire viscérale
- **TDM rachidienne et scintigraphie osseuse** : indiquées selon le contexte clinique de la maladie métastatique
- **Tomographie par émission de positons (PET scan)** : évaluation des masses résiduelles des séminomes après CT.

### D. Classification TNM :

T	<p><b><u>pT: Tumeur primitive – anatomopathologique :</u></b></p> <p><b><u>pTx:</u></b> Tumeur primitive non évaluable</p> <p><b><u>pT0:</u></b> Tumeur primitive non retrouvée</p> <p><b><u>pTis:</u></b> Néoplasie germinale intra tubulaire</p> <p><b><u>pT1:</u></b> Tumeur limitée au testicule et à l'épididyme sans invasion lymphovasculaire (La tumeur peut envahir l'albuginée mais pas la tunique vaginale).</p> <p><b><u>pT2:</u></b> Tumeur limitée Au testicule et à l'épididyme avec invasion lymphovasculaire ou tumeur étendue au-delà de l'albuginée avec invasion de la tunique vaginale</p> <p><b><u>pT3:</u></b> Tumeur envahissant le cordon spermatique avec ou sans invasion lymphovasculaire</p> <p><b><u>pT4:</u></b> Tumeur envahissant le scrotum avec ou sans invasion lymphovasculaire</p>
N	<p><b><u>N : Ganglions régionaux, classification clinique :</u></b></p> <p><b><u>Nx :</u></b> Ganglions régionaux non évaluables</p> <p><b><u>N0 :</u></b> Absence de métastase lymphonodale</p> <p><b><u>N1 :</u></b> Métastases gg avec une masse ganglionnaire ≤ 2cm ou multiples ganglions dont aucun &gt; 2cm</p> <p><b><u>N2 :</u></b> ggs &gt; 2cm mais ≤ 5cm ou multiples gg dont aucun &gt; 5cm.</p>

	<p><b>N3</b> : Masse ganglionnaire &gt; 5cm</p> <p><b>pN</b> : <b>Ganglions régionaux, classification anatomo-pathologique :</b></p> <p><b>pNx</b> : Ganglions régionaux non évaluables</p> <p><b>pN0</b> : Absence de métastase lymphonodale</p> <p><b>pN1</b> : ggs ≤ 2cm ou multiples ganglions dont aucun &gt; 2cm</p> <p><b>pN2</b> : Masse ganglionnaire &gt; 2cm mais ≤ 5cm de grand axe ou multiples ganglions dont aucun &gt; 5cm dans de grand axe</p> <p><b>pN3</b> : Masse ganglionnaire &gt; 5cm de grand axe.</p>
<b>M</b>	<p><b>M</b> : <b>Métastases à distance :</b></p> <p><b>Mx</b> : Statut métastatique non évaluable</p> <p><b>M0</b> : Pas de métastase à distance</p> <p><b>M1a</b> : Ganglions hors rétropéritoine et métastases pulmonaires</p> <p><b>M1b</b> : Autres sites métastatiques</p>

**S : Marqueurs tumoraux sériques :**

<b>Sx</b> : Marqueurs non disponibles			
<b>S0</b> : Marqueurs sous les limites des normales sériques			
	<b>LDH (U/l)</b>	<b>HCG (mU/ml)</b>	<b>AFP (ng/ml)</b>
<b>S1</b>	<1,5N	et <5000	et <1000
<b>S2</b>	>1,5, <10N	ou >5000, <50000	ou >1000, <10000
<b>S3</b>	>10N	ou >50000	ou >10000

**V. Traitement :**

❖ **Orchidectomie :**

- Constitue la **première étape** de la prise en charge de ces patients
- Nécessite la réalisation préalable d'une **cryoconservation de sperme**.
- Elle se fera par un abord inguinal permettant un clampage premier du cordon avant extériorisation du testicule.
- Une prothèse testiculaire peut être mise en place dans le même temps opératoire ou secondairement en fonction du choix du patient.
- Une orchidectomie partielle peut être proposée dans certains cas :
  - Tumeurs testiculaires bilatérales synchrones ou métachrones,
  - Tumeur testiculaire sur testicule unique.

**A. Tumeurs germinales non métastatiques :**

**1) Tumeur germinale non séminomateuse :**

- Bilan d'extension négatif et **marqueurs tumoraux non normalisés** après orchidectomie → **chimiothérapie comprenant trois cycles de BEP**.
- Dans les autres cas, trois attitudes sont possibles :
- Surveillance
- Chimiothérapie adjuvante
- Curage de stadification
- 2) Séminome :**
  - Les facteurs de risque de rechute (critères de Warde) sont :
    - L'envahissement du rete testis



- Taille tumorale supérieure à 4 cm.
  - **Surveillance** : « patients à faible risque de rechute »
    - **Radiothérapie** → rechute précoce
    - **Chimiothérapie** → rechutes plus évoluées.
    - Le taux de survie spécifique est estimé à 97–100 %.
  - **Chimiothérapie adjuvante** :
  - Patients à **haut risque de rechute** (présence **d'un ou deux critères de Warde**).
    - **Radiothérapie adjuvante : (20 Gy)**
  - Le séminome est particulièrement **radiosensible**
  - le champ d'irradiation limité à la région para-aortique.
  - B. Tumeur germinale métastatique :**
  - 1) Tumeur germinale non séminomateuse :**
  - La **chimiothérapie** repose actuellement sur un protocole standardisé associant trois drogues : bléomycine, étoposide et cisplatine (**BEP**).
  - Un **bilan de réévaluation** est réalisé à l'issue de cette chimiothérapie (3–4 semaines après) = **scanner thoraco-abdomino-pelvien** et le **dosage des marqueurs**.
  - La chirurgie des masses résiduelles est indispensable pour toute masse ganglionnaire supérieure à 1 cm.
  - 2) Séminome :**
  - **Stades N1, N2** → **radiothérapie** (chimiothérapie comme alternative).
  - **Stades N3** → **chimiothérapie** comprendra trois ou quatre cycles de BEP.
- La chirurgie des masses résiduelles après chimiothérapie est actuellement limitée aux masses de plus de 3 cm de diamètre.**